

Zeer zelden

- Pijn in de kaak of oor, oorontsteking of loopoor
- Psychische klachten zoals onrust, verwardheid, hallucinaties
- Epileptische aanvallen
- Nierbeschadiging. Dit merkt u onder andere aan vaak moeten plassen, vochtophoping in de benen of voeten (oedeem), gewichtstoename, bloed in de urine.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
- In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een of meer van de volgende verschijnselen: koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres admin@meliusklinieken.nl.



Melius
Klinieken

APD infuus

Beatrix de Rijkweg 8
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

info@meliusklinieken.nl
www.meliusklinieken.nl



Uw Anesthesioloog-pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met behulp van een infusie-therapie met pamidroninezuur (Aminohydroxy propylideenfosforzuur of APD), een bifosonaat.

In deze folder willen wij u graag informeren over deze behandeling.

Indicatie

- Aanvullende behandeling van pijnklachten bij Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS).
- Wervelbreuken
- Botafbraak (osteolyse) bij kanker

Werking

Bifosonaat verminderen de werking van geactiveerde cellen (osteoclasten), welke botafbraak bewerkstelligen. Remming van deze osteoclasten, maar ook van andere cellen welke de omgeving van het bot verzuren en stoffen produceren, kan zorgen voor vermindering van chronische pijnklachten.

Wegens slechte opname via het darmstelsel (minder dan 1% wordt opgenomen) worden bifosonaten bij voorkeur direct in het bloed (intraveneus) gegeven. De stof verblijft in het bot, vastgehecht aan (hydroxyapatiet)kristallen. Hier wordt de werking op onder andere de oecoclasten uitgevoerd.

Vorbereiding

U krijgt een datum en tijdstip waarop de behandeling plaats zal vinden. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie.

Medicijnen

Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig, u mag uw medicijnen innemen zoals u gewend bent.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor medicijnen, bepaalde voedingsmiddelen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen zoals alcohol? Waarschuw ons dan.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan 's ochtends een licht verteerbaar ontbijt te nuttigen en niet te zwaar of te uitgebreid te ontbijten.

De behandeling

Uw bloeddruk, pols en (wanneer nodig) hartritme worden vooraf, gedurende en na de behandeling gecontroleerd.

De verpleegkundige plaatst de infuusnaald en start het infuus zoals voorgeschreven door uw anesthesioloog-pijnspecialist. Pamidronaat wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling.

U krijgt meestal drie behandelingen, waarbij per keer 60mg Pamidronaat wordt toegediend in het tijdsbestek van 4 uur. Tussen de behandelingen wordt telkens 1 maand gewacht.

Na de behandeling

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis.

Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer.

Drink minimaal 1,5 liter per dag. Doordat pamidroninezuur aan beenweefsel wordt gebonden, kan het een scintigrafisch onderzoek van botten verstoren.

Het resultaat van de behandeling is vaak niet direct merkbaar. Het uiteindelijke resultaat kan twee tot drie maanden duren. Het is wel mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties en bijwerkingen

Vaak:

- Griepachtige verschijnselen tijdens of in de eerste 2 dagen na het infuus. U kunt last krijgen van koorts, vermoeidheid, koude rillingen, een ziek gevoel en blozen. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

Zelden

- Hoofdpijn, slaperigheid of juist slaperigheid
 - Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, geen eetlust, buikpijn, verstopping, diarree of een opgeblazen gevoel
 - Huiduitslag
 - Te weinig rode en witte bloedcellen of te weinig bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties (te merken aan infecties, keelpijn, koorts, blaren in de mond, gordelroos of koortslip) en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen of snel blauwe plekken.
 - Oogontsteking
 - Hartvaatklachten zoals hoge bloeddruk. Zeer zelden een verlaagde bloeddruk, hartkloppingen of hartfalen.
 - Pijn in botten, spieren en gewrichten
 - Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Te weinig calcium kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong.
 - Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus
- Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan.