

Resultaat

Het beste resultaat zien we na 6-8 weken. Rond deze tijd heeft u een controleafspraak. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres admin@meliusklinieken.nl.



Behandeling facetgewrichten

Beatrix de Rijkweg 8
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

info@meliusklinieken.nl
www.meliusklinieken.nl



Indicatie

Door irritatie van de zenuwtakjes van de gewrichtjes tussen de wervels (facetgewrichten) kan chronische nek en/of ruggijn ontstaan. Dit kan een uitstralende pijn veroorzaken. Pijn in de nek kan uitstralen naar de schouder en/of het hoofd. Pijn in de bovenrug kan uitstralen naar de flank. Pijn in de onderrug kan uitstralen naar de lies, heup en het bovenbeen. Strek- en draaibewegingen verergeren vaak de klachten, net als lang zitten, staan en slenteren.

Oorzaken

- Artrose van de wervelkolom
- Ingezakke wervels
- Scheefstand van de wervelkolom

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Behandeling

- Lokale injectie: er wordt verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel (corticosteroid) rond de gewrichtjes toegediend. Deze behandeling heeft als doel de pijn te verminderen door zwelling en irritatie van het weefsel te verminderen.
- RF (radiofrequente)-denervatie: warmtebehandeling van de zenuwtakjes wordt facetdenervatie genoemd. Door middel van RF (radiofrequente) stroom worden de zenuwtakjes verhit. Dit onderbreekt de pijngeleiding, waardoor de pijn voor langere tijd wordt geremd.

Tijdens een behandeling van uw rug ligt u in buikligging op de behandeltafel. Onder uw buik wordt een kussen geplaatst om de kromming van uw rug minder te maken. Tijdens een behandeling van uw nek ligt u op uw rug.

De plaats van injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Hierna brengt de pijnspecialist met behulp van röntgenstralen 3-4 naalden naar de zenuwtakjes van de betreffende gewrichten. De positie van de naalden wordt gecontroleerd met 'teststroompjes'. Dit veroorzaakt een prikkelend en tikkend gevoel. Als de naalden goed staan worden de zenuwtakjes verdoofd en met de RF-stroom behandeld. Dit remt de pijngeleiding van de zenuw. Uw spierkracht blijft intact. Alleen de pijngeleiding wordt beïnvloed.

Complicaties en bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. Een RF-facetbehandeling leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De Anesthesioloog-pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

Na een RF-behandeling kunnen de volgende complicatie of bijwerkingen optreden:

- Een beperkt risico op het ontstaan van een infectie of bloeding.
- Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen.
- Er kan tijdelijk kracht- en/of gevoelsverlies van de arm (bij nekbehandeling) of been (bij rug behandeling) optreden.
- Er kan tijdelijk gevoelsvermindering optreden van de huid in de buurt van de behandelde facetgewrichten
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.

Door het ontstekingsremmende medicijn:

- Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden; de anticonceptiepijl is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!
- Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren

U mag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen.