



Behandeling ganglion pterygopalatinum

Beatrix de Rijkweg 8
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

info@meliusklinieken.nl
www.meliusklinieken.nl



Bij sommige soorten hoofd- en aangezichtspijn kan een zenuwknoop achter de neus verantwoordelijk zijn voor de klachten. Deze structuur, het ganglion pterygopalatinum (sfenopalatinum), kan geïrriteerd raken en heftige pijn geven. Deze pijnklachten zijn te verhelpen door deze zenuwknoop te verwarmen en zo een aantal pijnvezels uit te schakelen. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandeling.

Bloedverdünnende medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Nuchter zijn

U moet voor deze behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor de behandeling na 24.00 uur niets meer mag eten. Van 24.00 uur tot 2 uur voor de behandeling mag u alleen nog drinken: water, thee, appelsap en andere doorzichtige dranken, een kopje zwarte koffie is toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Vanaf 2 uur voor de behandeling mag u helemaal niets meer innemen. Behalve een klein slokje water voor het innemen van medicatie of tijdens het tandenpoetsen.

NIET TOEGESTAAN ZIJN MELK EN MELKPRODUCTEN, KOOLZUURHOUDENDE DRANKEN EN ALCOHOLISCHE DRANKEN.

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving met een lichte sedatie (roesje).

We helpen u eerst om in de juiste houding te liggen. Tijdens de behandeling wordt de huid verdoofd en een dunne naald wordt in de wang geprikt. Wanneer de naald met behulp van een röntgenapparaat op de juiste plaats is geplaatst controleren

we met stroompjes door de naald of de naald goed zit. Via de naald wordt na verdoving een warmtebeschadiging gemaakt, doordat de naaldpunt wordt verwarmd. Op deze wijze worden een aantal pijnvezels in de zenuwknoop uitgeschakeld. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Na de behandeling wordt u op een bed op de dagbehandeling gelegd en krijgt u na enige controles een (telefonische) vervolfgafsprak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot wel twee maanden later kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect merkt.

Complicaties/bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling van het ganglion pterygopalatinum (sfenopalatinum) leidt zelden tot blijvende schade. De Anesthesioloog-pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

Na deze behandeling kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Tijdelijke hoofdpijn
- Een neusbloeding
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloedingstoring in de wang ontstaan
- Een verminderd gevoel in het verhemelte.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres admin@meliusklinieken.nl.