



Behandeling ganglion stellatum

Beatrix de Rijkweg 8
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

info@meliusklinieken.nl
www.meliusklinieken.nl



Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die onderin de hals ligt, ter hoogte van de zevende halswervel. Het maakt onderdeel uit van het onwillekeurig zenuwstelsel (over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle). Behandeling van deze zenuwknoop kan de pijngeleiding doen verminderen, de doorbloeding verbeteren en de temperatuur reguleren.

Indicatie

Deze behandeling kan worden gedaan bij sommige vormen van pijn in de onderkaak, nek, schouder en arm, waaronder pijn door een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Ook wordt deze behandeling gedaan voor de behandeling van opvlieters.

Bloedverdünnende medicijnen

Als u bloed verdünnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Behandelingen

- Injectie: er wordt rond de zenuwknoop een verdovingsvloeistof toegediend.
- stroombehandeling: De zenuwknoop wordt met radiofrequente (RF) stroom verwarmd, waardoor de pijngeleiding voor langere tijd wordt onderbroken. Tijdens deze behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. De plaats van behandeling wordt gedesinfecteerd en eventueel voor verdoofd. Met behulp van röntgenstralen en/of echografie wordt de zenuwknoop opgezocht en de naald ingebracht. Eventueel wordt er wat contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald goed te zien. Bij de RF-behandeling wordt met een elektrisch stroompje gecontroleerd of de naald dicht bij de zenuwknoop staat.

Dit veroorzaakt een prikkelend, tintelend of drukkend gevoel. Daarna wordt de behandeling uitgevoerd.

Complicaties en bijwerkingen

- Heesheid of slikklachten. Deze klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
- Hangend ooglid, wazig zien en/of een loopneus. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
- Een warm gevoel in uw wang, nek en/of arm.
- Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
- Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen.

U mag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen.

Resultaat

Mogelijk merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na 6-8 weken. Rond deze tijd heeft u een controleafspraak. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres admin@meliusklinieken.nl.