

Na de behandeling kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard.
- Er kan een verdoofd gevoel optreden in het behandelde gebied. Ook dit verdwijnt of vermindert na enige tijd.
- Tijdelijke hoofdpijn.
- Als er een bloedvaatje is geraakt tijdens het prikken, kan er een bloeding in de wang ontstaan.
- Heel zelden kunnen er mondbacteriën in het hersenvocht komen wat kan leiden tot hersenvliesontsteking. Hierbij ontstaat binnen een tijdsbestek van 6 uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid. In dat geval moet zo snel mogelijk een behandeling met antibiotica worden gestart. Neemt u bij het ontstaan van koorts (meer dan 38,5°C) contact op met Melius Klinieken of met uw huisarts.

Door het ontstekingsremmende medicijn:

- Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie verstoord worden. De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.
- Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden gaan schommelen door het ontstekingsremmende medicijn.

### Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres [admin@meliusklinieken.nl](mailto:admin@meliusklinieken.nl).



# Behandeling ganglion n. trigeminus

Beatrix de Rijkweg 8  
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

[info@meliusklinieken.nl](mailto:info@meliusklinieken.nl)  
[www.meliusklinieken.nl](http://www.meliusklinieken.nl)



## **(behandeling ganglion van Gasser; behandeling volgens Sweet)**

Het ganglion is de zenuwknoop van de aangezichtszenuw (nervus trigeminus). Deze zenuwknoop ligt in de schedel. Uit de zenuwknoop ontspringen drie vertakkingen naar gebieden in het gezicht (het voorhoofd en de regio van de boven- en de onderkaak).

## **Oorzaken**

De precieze oorzaak van aangezichtspijn is vaak niet bekend. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

- een bloedvat dat tegen de zenuw drukt;
- een tumor;
- ontsteking (gordelroos; multiple sclerose).

## **Indicatie**

Aangezichtspijn die onvoldoende reageert op medicamenteuze behandeling.

## **Bloedverdünnende medicijnen**

Als u bloedverdünnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

## **Zwangerschap**

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

## **Allergie**

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

## **Pacemaker / ICD**

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

## **Nuchter zijn**

U moet voor deze behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor de behandeling na 24.00 uur niets meer mag eten. Van 24.00 uur tot 2 uur voor de behandeling mag u alleen nog drinken: water, thee, appelsap en andere doorzichtige dranken, een kopje zwarte koffie is toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Vanaf 2 uur voor de behandeling mag u helemaal niets meer innemen. Behalve een klein slokje water voor het innemen van medicatie of tijdens het tandenpoetsen.

**NIET TOEGESTAAN ZIJN MELK EN MELKPRODUCTEN, KOOLZUURHOUDENDE DRANKEN EN ALCOHOLISCHE DRANKEN.**

## **Behandeling**

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving met een lichte sedatie (roesje). Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Uw hoofd wordt gefixeerd met tape. Met behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats van de behandeling bepaald. De plaats van de injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Hierna brengt de Anesthesioloog-pijnspecialist met behulp van röntgenstralen de naald(en) naar de juiste plaats. Met elektrische stroom wordt de positie van de naaldpunt gecontroleerd. Hiervoor laten we u dus "wakker" worden. Als de naald(en) goed staat wordt de stroom/(P)RF-behandeling uitgevoerd. Via de naald wordt een warmtebeschadiging gemaakt, doordat de naaldpunt verwarmd wordt. Op deze wijze worden een aantal pijnvezels in de zenuw uitgeschakeld. Hierna wordt gecontroleerd of het huidgebied waar u de pijn voelt wat dover aanvoelt. Is dit nog niet het geval dan wordt deze behandeling meteen herhaald. Dit kan in totaal 3 maal plaats vinden. Vaak wordt er tot slot nog een ontstekingsremmend medicijn ingespoten. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds verwijderen.

Na de behandeling wordt u op een bed op de dagbehandeling gelegd en krijgt u na enige controles een (telefonische) vervolfgafpraak mee.

## **Na de behandeling**

Na de behandeling mag u op dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot wel twee maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

## **Complicaties en bijwerkingen**

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De thermolaesie van het ganglion van Gasser leidt zelden tot blijvende schade. De Anesthesioloog-pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.