



Behandeling van een lokale zenuw

Beatrix de Rijkweg 8
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

info@meliusklinieken.nl
www.meliusklinieken.nl



Door een beschadiging/overgevoeligheid van een perifere zenuw ervaart u chronische neuropatische (zenuw) pijn.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken zijn:

- Operaties
- Trauma

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Pacemaker / ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Behandeling

De behandeling betreft een therapeutische injectie, al dan niet in combinatie met een PRF-behandeling.

- Therapeutische injectie: Rond de zenuw wordt een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroid) toegediend. De ontstekingsremmer vermindert de zwelling van de zenuw, waardoor de zenuw tot rust kan komen en kan herstellen.
- PRF-behandeling: De zenuw wordt gedurende enkele minuten behandeld met gepulseerde radiofrequente stroom (PRF). Met deze korte stroomstootjes wordt de pijnprikkel van de zenuw geremd waardoor u minder pijn gaat ervaren. Hier voelt u weinig tot niets van.

De plaats van behandeling wordt gedesinfecteerd. Met echografie of röntgendoorlichting wordt de zenuw opgezocht en de naald ingebracht.

Om te controleren of de naald dicht bij de zenuw staat wordt er een elektrisch stroompje via de naald gegeven. Dit veroorzaakt een prikkelend, tintelend of drukkend gevoel. Daarna wordt de behandeling uitgevoerd.

Complicaties en bijwerkingen

- Er kan tijdelijk verlies in het aangedane gebied optreden
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
- Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal dagen verhoogd zijn.
- Bij vrouwen kunnen er opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus tijdelijk ontregeld zijn door de corticosteroiden. De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!
- Als er een bloedvaatje geraakt is bij het prikken, kan er een bloeding ontstaan.
- Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen tot een week aanhouden maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

Na de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

Resultaat

Mogelijk merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na een aantal weken. Rond deze tijd heeft u een controleafspraak. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Kliniek via telefoonnummer 040-8200777 of email adres admin@meliusklinieken.nl.