



Infiltratie van een gewricht

Beatrix de Rijkweg 8
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

info@meliusklinieken.nl
www.meliusklinieken.nl



Deze behandeling houdt in dat een naald, eventueel onder röntgenbegeleiding of echogeleid, in een gewricht wordt geplaatst. Door deze naald wordt een ontstekingsremmende stof of een stof die de functie van het gewricht probeert te verbeteren ingespoten.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

De behandeling

We helpen u eerst om in de juiste houding te liggen of zitten. De naald wordt, eventueel onder röntgenbegeleiding of echogeleid, in het gewricht geplaatst. Daarna wordt het middel ingespoten. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding in het gewricht beïnvloed, of de "smering" van het gewricht verbeterd, waardoor in de meeste gevallen vermindering van pijn optreedt. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds verwijderen. U kunt dan ook weer douchen of baden.

Na de behandeling

U mag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen.

Na de behandeling kunt u de eerste twee weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen.

Pas na enkele weken tot wel twee maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

U krijgt een controleafspraak mee. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

Complicaties en bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De infiltratie van een gewricht leidt zelden tot blijvende schade. De Anesthesioloog-pijnspecialist

overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een infiltratie van een gewricht optreden:

- Allergische reactie op de toegediende medicatie.
- Door het ontstekingsremmende medicijn kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden.

De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!

- Bij diabetici kunnen de bloedsuikerwaarden gaan schommelen door het ontstekingsremmende medicijn.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres admin@meliusklinieken.nl.