

## Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres [admin@meliusklinieken.nl](mailto:admin@meliusklinieken.nl).



# Iontoforese

Beatrix de Rijkweg 8  
5657 EG Eindhoven

tel. 040-8200777

[info@meliusklinieken.nl](mailto:info@meliusklinieken.nl)  
[www.meliusklinieken.nl](http://www.meliusklinieken.nl)



Uw Anesthesioloog-pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten met een iontoforese behandeld gaan worden. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

## Wat is iontoforese?

Door middel van iontoforese worden er met behulp van zwakstroom medicijnen via de huid (transdermaal) toegediend. Dit gebeurt met een medicijnpleister en het maken van een elektrisch veld. Het medicijn werkt op de zenuwuiteinden. De pijn prikkel wordt hierdoor minder goed doorgegeven in uw lichaam. Het medicijn wordt in een hele lage dosering verder door het lichaam verspreid.

## Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling kan doorgaan.

## Allergie

Bent u overgevoelig voor bijvoorbeeld medicijnen, voedingsmiddelen, latex, pleisters of huid ontsmettingsmiddelen en u heeft dit nog niet doorgegeven waarschuw ons dan.

## Nuchter

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan om een licht verteerbare maaltijd te nemen.

## Wanneer wordt iontoforese gebruikt?

Iontoforese wordt toegepast bij behandeling van:

- Zenuwpijn
- Complex regionaal pijnsyndroom
- Littekenpijn
- Pijn in spieren en gewrichten
- acute pijnklachten (zoals acute tendinitis)
- behandeling van aanhoudende / chronische pijnklachten (geassocieerd met kalk afzetting).

Als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is wilt u dit vooraf tegen uw arts vertellen:

- Overgevoeligheid voor het medicijn Ketamine.
- Verhoogde bloeddruk die niet onder controle is.
- Als u zwanger bent of denkt te zijn.
- Als u angina pectoris heeft (pijn op de borst).
- Als u een verhoogde hersendruk heeft.
- Als u een verhoogde oogdruk heeft.
- Als u een pacemaker of ICD heeft.
- Als u een neurostimulator heeft.

## Vorbereiding thuis

U mag op de dag van uw behandeling geen huid crème of bodylotion gebruiken in het gebied waar de pijn zit.

U draagt makkelijk zittende kleding die geen druk geeft op het te behandelen gebied.

U mag uw huidige (pijn)medicatie innemen, tenzij de arts anders voorschrijft. Er mogen geen familieleden of bekenden bij deze behandeling aanwezig zijn.

## De behandeling

U neemt plaats op een bed of stoel. Uw huid wordt eerst ontvet met alcohol. De medicatie wordt op een soort pleister met een dunnen spons gespoten en op de pijnlijke plaats geplakt. De tweede pleister wordt op ongeveer 10 cm van de eerste pleister geplakt. Vervolgens worden de elektrodes aan de pleisters vastgemaakt en het apparaat aangezet. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in het lichaam opgenomen. Tijdens de behandeling kan een prikkelend of licht brandend gevoel ontstaan. U kunt prikkeltjes of kriebeltjes voelen. Als de behandeling te pijnlijk is, wordt de standaardinstelling lager gezet. De behandeling duurt dan iets langer. Normaal gesproken duurt de behandeling 20 minuten.

## Complicaties/Bijwerkingen

Als mogelijke complicaties van deze behandeling kunnen tijdelijke bloeddrukschommelingen optreden. Deze zijn meestal van korte duur, maar kunnen soms enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en misselijkheid. Deze klachten gaan weer vanzelf over. Enkele patiënten klagen na de behandeling over hoofdpijn.

Gebrek aan eetlust.

Vermoeidheid

Wazig zien

Plaatselijke roodheid van de huid onder de pleisters.

## Na de behandeling

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis.

Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer.

We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling kan enige tijd op zich laten wachten. Het is echter mogelijk dat u al snel een gunstig effect op uw pijnklachten merkt. Na 2 weken heeft u een belafsprake met de pijnconsulente om het effect van de behandeling te bespreken.