

Praktijkinformatie

Melius klinieken is het centrum voor geïntegreerde pijnzorg.

Het pijncentrum staat voor een kwalitatieve, hoogwaardige en efficiënte behandeling van uw chronische pijn. De medisch specialisten bij Melius Klinieken bezitten allen ruime ervaring in het behandelen van patiënten met chronische pijnklachten.

Melius Klinieken is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 16:30 uur. U kunt ons bereiken via de onderstaande telefoonnummer of via ons algemeen e-mail adres admin@meliusklinieken.nl.

Bergen op Zoom: Borgvlietsdreef 151, 4615 EC Bergen op Zoom

Bergen op Zoom: Fruiteniersdreef 2-4, 4614HH Bergen op Zoom

Breda: Nijverheidssingel 89-91, 4811 ZV Breda

Eindhoven: Beatrix de Rijkweg 8, 5657 EG Eindhoven

Roermond: Zwartbroekpoort 3, 6041 LS Roermond

Algemeen telefoon: 085 – 016 16 36



Melius
Klinieken

Lidocaïne infuus

admin@meliusklinieken.nl

www.meliusklinieken.nl



Lidocaine is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum), vaak gebruikt om een gebied ongevoelig te maken (verdoven). Lidocaine vermindert (eveneens) de zenuwactiviteit, vermindert zenuw (neurogene) ontsteking en verzorgt een aanpassing (kalmeren) van zenuwsignalen, waardoor de pijnklachten verminderen.

Indicaties

- Chronische, wijdverspreide pijn.
- Aanhoudende (refractaire) zenuwpijn.
- Kortdurende en pijnlijke (cluster) hoofdpijnklachten.

Contra-indicaties

- Allergie voor lidocaine/type amide lokaal anestetica.
- Hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag, afwijkende hartfilm (ECG)).
- Toevallen (stuipen).
- Zwangerschap.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan hoeft u deze niet te stoppen.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor Lidocaine? Waarschuw ons dan.

Pacemaker/ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling.

Behandeling

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. We raden u wel aan om het ontbijt licht te houden.

Lidocaine wordt toegediend via een infuus. De behandeling duurt 2 uur. Tijdens de behandeling wordt u aangesloten aan een monitor voor registratie van het hartritme, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

Na afloop blijft u nog 30 minuten op de afdeling, als u zich goed voelt mag u naar huis.

Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen.

Complicaties en bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen of complicaties zijn zeldzaam. Ondanks dat we u gedurende de gehele behandeling controleren kunnen er bijwerkingen optreden:

- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Slaap
- Tintelingen rond de mond
- Metaalsmaak
- Onduidelijke spraak
- Tunnelvisie
- Oorsuizen
- Ongecontroleerde bewegingen (tremor)
- Dronken gevoel/gevoel misselijk te zijn (nausea)

Deze bijwerkingen verminderen en verdwijnen in verreweg de meeste gevallen bij het verminderen of stoppen van het lidocaine infuus.

- Verlaging of verhoging van de bloeddruk
- Verlaging of verhoging van het hartritme
- Onregelmatige hartslag
- Flauwvallen
- Toevallen (stuipen)
- Allergische reacties.

In zeer zeldzame gevallen zijn deze complicaties ernstig en kunnen zij lijden tot overlijden.

Resultaat

Mogelijk merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na een aantal weken. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt besproken tijdens de (telefonische) controle afspraak.

Tot slot

Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Melius Klinieken via telefoonnummer 085-016 16 36 of email adres admin@meliusklinieken.nl.